

Esquema nacional de vacunación, Honduras 2023

Vacuna	Edad de aplicación						
	Recién nacido	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años
Niños							
BCG ¹	Dosis única						
Hepatitis B pediátrica ²	Dosis única						
Poliovirus Inactivada (VPI)		1era dosis	2da dosis				
Polio oral (bVOP o Sabin) ³				3era dosis		Refuerzo	
DPT-HepB-Hib (Pentavalente)		1era dosis	2da dosis	3era dosis			
Rotavirus ⁴		1era dosis	2da dosis				
Neumococo conjugada		1era dosis	2da dosis	3era dosis			
SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) ⁵					1era dosis	2da dosis	
Hepatitis A					Dosis única		
DPT						1er Refuerzo	2do Refuerzo
Adolescentes y adultos							
Hepatitis A	Grupos en riesgo: Trabajadores de la Salud Primer contacto: 1era dosis 6 meses después de 1era dosis: 2da dosis						
Hepatitis B	Grupos en riesgo: Primer contacto: 1era dosis Un mes después de 1era dosis: 2da dosis 6 meses después de 1era: 3era dosis Pacientes en diálisis y víctimas agresión sexual: 4 dosis						
Td (Toxoide tetánico difterico)	11 años: Refuerzo y luego 1 dosis cada 10 años Embarazadas no vacunadas: Primer contacto: 1era dosis Un mes después de 1era dosis: 2da dosis Completar esquema de 5 dosis después del embarazo 3era dosis: 6 meses después de la 2da dosis 4ta dosis: 1 año después de la 3era dosis 5ta dosis: 1 año después de la 4ta dosis Grupos en riesgo: Primer contacto: 1era dosis Un mes después de 1era dosis: 2da dosis 6 meses después de 2da dosis: 3era dosis Cada 10 años: refuerzo						
Tdap (Toxoide tetánico, difterico y vacuna antipertussis acelular)	Embarazadas: una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina Otros grupos en riesgo: Trabajadores de Salud, una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina						
VPH (Virus del Papiloma Humano)	Adolescentes mujeres de 11 años: Primer contacto: 1era dosis 6 meses después de 1ra dosis						
Grupos en riesgo							
DT pediátrica ⁶	2da dosis: 4 meses 3era dosis: 6 meses Refuerzo: 18 meses Refuerzo: 4 años						
Poliovirus Inactivada (VPI)	1era dosis: 2 meses 2da dosis: 4 meses 3era dosis: 6 meses						
SRP (Sarampión y Rubéola y Parotiditis) con la cepa Jeryl Lynn	Una dosis a mayores de 5 años de edad no vacunados.						
Influenza ⁷	Población de 6 a 23 meses y enfermos crónicos de 2 a 59 años: Dosis anual en población de 6 meses a 8 años y aplicar 2da dosis con intervalo de 1 mes después de la primera dosis si previamente no ha sido vacunado. Trabajadores de la salud, trabajadores de granjas avícolas, embarazadas y adultos mayores de 60 años dosis única anual						
Fiebre Amarilla ⁸	Dosis única mayores de 1 año de edad (viajeros a zonas en riesgo de transmisión).						
COVID-19 Pediátrica	Población de 6 meses a 4 años, 11 meses y 29 días: Tres dosis del esquema primario con un intervalo de 28 días, entre la primera y la segunda dosis, dos meses después de la segunda se aplica la tercera dosis. Población de 5 a 11 años: Dos dosis del esquema primario con un intervalo de 28 días, inmunocomprometidos, recibirán una tercera dosis en 28 días después de la segunda dosis, un primer refuerzo, 5 meses después de la segunda o tercera dosis según corresponda, ,						
COVID-19 Adulto	Población de 12 años y más: Dos dosis del esquema primario con un intervalo de 28 días, inmunocomprometidos, recibirán una tercera dosis en 28 días después de la segunda dosis, un primer refuerzo, 3 meses después de la segunda o tercera dosis según corresponda el segundo refuerzo, cuatro meses después del primer refuerzo.						
Viruela Simica	Contactos estrechos de casos positivos confirmados y personal de salud de los equipos de respuesta rápida de 18 años y más, sin antecedente de vacuna recibirán dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, Contactos estrechos de casos positivos confirmados y personal de salud de los equipos de respuesta rápida DE 50 años y más con antecedentes de vacuna, recibirán una dosis única.						